

# ATLAS DE RÉPARTITION DES OISEAUX NICHEURS D'ALSACE

## Liste commentée des espèces

(version amendée de mars 2008 - en gras les corrections par rapport à la précédente version)

Espèces	LR	Espèces sensibles	Période de nidification (nicheurs possibles)	Remarques
Grèbe castagneux	X		1 avril au 1 août	Attention aux adultes non-nicheurs présents en période de reproduction - les chanteurs sont des nicheurs probables - nidification facile à prouver par l'observation des jeunes suivant les adultes
Grèbe huppé			15 mars au 15 juillet	Attention aux adultes non-nicheurs présents en période de reproduction - nidification facile à prouver par l'observation des jeunes suivant les adultes
Grand Cormoran		X	15 avril au 15 juin	<b>Seules les données de nidification certaine sont à mentionner</b>
Butor étoilé	X	X	1 avril au 1 juillet	Les chanteurs sont des nicheurs probables - preuve de nidification à rechercher
Blongios nain	X	X	15 mai au 15 août	Preuves de nidification à rechercher
Bihoreau gris		X	15 avril au 15 juillet	<b>Seules les données de nidification certaine sont à mentionner</b>
Héron cendré			1 avril au 1 juin	<b>Seules les données de nidification certaine sont à mentionner</b>
Héron pourpré		X	15 avril au 15 juillet	<b>Seules les données de nidification certaine sont à mentionner</b>
<b>Grande Aigrette</b>		<b>X</b>		<b>Seules les données de nidification certaine sont à mentionner</b>
Cigogne blanche			1 avril au 15 juillet	<b>Seules les données de nidification certaine sont à mentionner</b>
Cigogne noire		X	<b>15 mai au 15 juillet</b>	<b>Preuves de nidification à rechercher</b>
Cygne tuberculé			15 mars au 15 juillet	<b>Seules les données de nidification certaine sont à mentionner</b>
<b>Oie cendrée</b>			<b>1 avril au 1 juillet</b>	<b>Seules les données de nidification certaine sont à mentionner</b>
<b>Ouette d'Égypte</b>			<b>1 avril au 15 juillet</b>	<b>Seules les données de nidification certaine ou probable sont à mentionner : niche en hauteur (arbre, pylone) - tout oiseau perché est un indice à surveiller</b>
Canard chipeau	X		15 avril au 15 juillet	<b>Seules les données de nidification certaine sont à mentionner</b>
Sarcelle d'hiver	X		15 avril au 15 juillet	<b>Seules les données de nidification certaine sont à mentionner</b>
Canard colvert			<b>15 avril au 15 juin</b>	<b>Attention aux adultes non-nicheurs présents en période de reproduction</b>
Sarcelle d'été			15 avril au 15 juillet	<b>Seules les données de nidification certaine sont à mentionner</b>
Canard souchet			15 avril au 15 juillet	<b>Seules les données de nidification certaine sont à mentionner</b>
Fuligule milouin	X		1 mai au 15 août	<b>Seules les données de nidification certaine sont à mentionner</b>
Fuligule morillon	X		1 mai au 15 août	<b>Seules les données de nidification certaine sont à mentionner</b>
Harle bièvre	X		1 avril au 15 juillet	<b>Seules les données de nidification certaine sont à mentionner</b>
Bondrée apivore	X		15 mai au au 1er août	Attention aux migrateurs
Milan noir			1 avril au 15 juillet	

Espèces	LR	Espèces sensibles	Période de nidification (nicheurs possibles)	Remarques
Milan royal	X		1 avril au 15 juillet	A rechercher dans les zones favorables
Busard des roseaux	X	X	<b>1 mai au 1 août</b>	
Busard Saint-Martin	X	X	<b>1 mai au 1 août</b>	Nicheur ancien...
Busard cendré	X	X	1 mai au 1 août	A rechercher dans les zones favorables
Autour des palombes			15 mars au 15 juillet	
Epervier d'Europe			15 mars au 15 juillet	
Buse variable			15 mars au 15 juillet	
Faucon crécerelle			15 mars au 15 juillet	
Faucon hobereau			15 avril au 15 août	
Faucon pèlerin	X	X	1 mars au 15 juillet	<b>Ne noter que les nicheurs probables et certains</b>
Gélinotte des bois	X	X	<b>Toute l'année</b>	
Grand Tétrás	X	X	<b>Toute l'année</b>	Ne pas rechercher spécialement ! Suivi effectué par le GTV
Perdrix rouge	X		15 mars au 15 juillet	Introduite !
Perdrix grise	X		15 mars au 15 juillet	
Caille des blés	X		1 mai au 15 juillet	
Faisan de Colchide			15 mars au 15 juin	
Râle d'eau			<b>1 avril au 1 août</b>	
Marouette ponctuée	X		1 avril au 15 juillet	
Râle des genêts	X	X	1 mai au 15 juillet	
Gallinule poule-d'eau			15 mars au 15 juillet	
Foulque macroule			1 avril au 15 juillet	
Oedicnème criard	X	X	1 avril au 1 juillet	
Petit Gravelot			15 avril au 1 juillet	
Vanneau huppé	X		1 avril au 31 mai	Attention aux migrateurs non nicheurs - seules les observations d'avril et de mai peuvent se rapporter à des nicheurs possibles. Des comportements de dissuasion sont des indices de nidification certaine.
Bécassine des marais	X	X	15 mars au 15 juillet	Niche-t-elle encore en Alsace. Preuve à rechercher (observation de chanteurs)
Bécasse des bois			15 mars au 15 juillet	<b>Ne noter que les chanteurs (croûle) et les nicheurs certains</b>
Courlis cendré	X		15 mars au 15 juin	
Chevalier guignette	X		1 juin au 30 juin	Attention aux migrateurs non nicheurs - seules les observations de juin peuvent se rapporter à des nicheurs possibles. Des comportements de dissuasion sont des indices de nidification certaine.
Mouette mélanocéphale	X		15 avril au 15 juin	<b>Seules les données de nidification certaine sont à mentionner</b>
Mouette rieuse	X		15 avril au 15 juin	<b>Seules les données de nidification certaine sont à mentionner</b>
Goéland cendré			15 avril au 15 juin	<b>Seules les données de nidification certaine sont à mentionner</b>
Goéland leucophée	X		15 avril au 15 juin	<b>Seules les données de nidification certaine sont à mentionner</b>
Sterne pierregarin	X		1 mai au 1 juillet	<b>Seules les données de nidification certaine sont à mentionner</b>
Pigeon colombin			<b>1 mars au 15 juillet</b>	
Pigeon ramier			1 mars au 15 juillet	
Tourterelle turque			<b>1 mars au 15 juillet</b>	
Tourterelle des bois			1 mai au 15 juillet	
Coucou gris			15 avril au 15 juillet	
Effraie des clochers			15 mars au 15 septembre	La nidification se prolonge durant tout l'été lors des années à secondes pontes

Espèces	LR	Espèces sensibles	Période de nidification (nicheurs possibles)	Remarques
Petit-duc scops	X	X	1 mai au 31 juillet	A rechercher dans les zones favorables
Grand-duc d'Europe	X	X	15 février au 15 juillet	A rechercher au crépuscule, dès la fin de l'hiver
Chevêchette d'Europe	X	X	1 mars au 15 juillet	A rechercher dans les Hautes-Vosges
Chevêche d'Athéna	X	X	15 février au 15 juillet	
Hibou moyen-duc			15 février au 15 juillet	<b>Ne noter que les chanteurs et les nicheurs certains</b>
Chouette hulotte			1 février au 15 juillet	Chante volontiers en plein hiver
Hibou des marais	X	X	1 avril au 15 juillet	Nicheur ancien, à rechercher dans les milieux favorables
Chouette de Tengmalm	X	X	15 février au 15 juillet	A rechercher au crépuscule, dès la fin de l'hiver
Engoulevent d'Europe	X	X	15 mai au 15 juillet	A rechercher dans les zones favorables
Martinet noir			<b>1 juin ou 15 juillet</b>	Vérifier la nidification
Martinet à ventre blanc	X		1 mai au 15 juillet	A contrôler dans les sites connus et rechercher ailleurs...
Martin-pêcheur d'Europe			15 mars au 15 juin	Les données de fin juin et juillet peuvent concerner des oiseaux erratiques
Guêpier d'Europe		X	15 mai au 15 juillet	A rechercher dans les zones favorables
Huppe fasciée	X	X	15 avril au 15 juillet	A rechercher dans les zones favorables
Torcol fourmilier			<b>1 mai au 15 juillet</b>	
Pic cendré			<b>1 mars au 15 juillet</b>	
Pic vert			<b>1 mars au 15 juillet</b>	
Pic noir			<b>1 mars au 15 juillet</b>	
Pic épeiche			<b>1 mars au 15 juillet</b>	
Pic mar			<b>1 mars au 15 juillet</b>	
Pic épeichette			<b>1 mars au 15 juillet</b>	
Cochevis huppé	X		15 mars au 15 juin	A rechercher dans les zones favorables
Alouette lulu	X		15 mars au 15 juin	A rechercher dans les zones favorables
Alouette des champs	X		15 mars au 15 juin	
Hirondelle de rivage			15 mai au 31 juillet	<b>Ne noter que les nicheurs probables ou certains : la nidification est facile à prouver</b>
Hirondelle rustique			15 avril au 15 juillet	
Hirondelle de fenêtre			1 mai au 15 juillet	
Pipit rousseline	X		1 mai au 15 juillet	A rechercher dans les zones favorables
Pipit des arbres			<b>1 mai au 15 juillet</b>	
Pipit farlouse			1 avril au 1 juillet	Niche dans les Vosges, à rechercher en plaine
Pipit spioncelle	X		15 avril au 15 juillet	Niche dans les Hautes-Vosges
Bergeronnette printanière	X		<b>1 mai au 15 juillet</b>	Attention aux migrateurs
Bergeronnette des ruisseaux			<b>1 avril au 15 juillet</b>	
Bergeronnette grise			15 mars au 15 juillet	
Cincle plongeur			15 février au 15 juin	Nicheur précoce
Troglodyte mignon			15 mars au 15 juillet	
Accenteur mouchet			15 mars au 15 juillet	
Accenteur alpin	X		15 avril au 15 août	A rechercher dans les Hautes-Vosges
Rougegorge familier			1 avril au 15 juillet	
Rossignol philomèle			1 mai au 15 juillet	Attention aux migrateurs de passage fin avril
Gorgebleue à miroir	X	X	15 avril au 15 juillet	A rechercher dans les zones favorables
Rougequeue noir			15 mars au 15 juillet	
Rougequeue à front blanc			1 avril au 15 juillet	
Tarier des prés	X		<b>15 mai au 15 juillet</b>	Attention aux migrateurs de passage fin avril et début mai
Tarier pâtre			1 avril au 15 juillet	
Traquet motteux	X		<b>15 mai au 15 juillet</b>	Attention aux migrateurs de passage fin avril et début mai
Monticole de roche		X	1 mai au 15 juillet	A rechercher dans les Hautes-Vosges
Merle à plastron			15 avril au 15 juillet	Attention aux migrateurs, présents encore fin avril et début mai en plaine

Espèces	LR	Espèces sensibles	Période de nidification (nicheurs possibles)	Remarques
Merle noir			15 mars au 15 juillet	
Grive litorne			1 avril au 1 juillet	Attention aux migrateurs
Grive musicienne			15 mars au 15 juillet	
Grive draine			<b>1 avril au 15 juillet</b>	
Locustelle tachetée			<b>1 mai au 15 juillet</b>	
Locustelle lusciniôide	X		15 avril au 15 juillet	Niche en Petite Camarque Alsacienne. A rechercher ailleurs.
Phragmite des joncs			15 avril au 15 juillet	
Rousserolle verderolle			15 mai au 15 juillet	
Rousserolle effarvatte			1 mai au 15 juillet	
Rousserolle turdoïde	X		1 mai au 15 juillet	Chanteurs à rechercher en Petite Camargue Alsace et en d'autres rosières rhénanes
Hypolaïs icterine			1 mai au 15 juillet	
Hypolaïs polyglotte	X		1 mai au 15 juillet	
Fauvette babillarde			<b>1 mai au 15 juillet</b>	<b>Attention aux migrateurs non nicheurs. Certains oiseaux chantent en début de saison mais ne nichent pas : confirmer le stationnement</b>
Fauvette grisette			15 avril au 15 juillet	
Fauvette des jardins			15 avril au 15 juillet	
Fauvette à tête noire			1 avril au 15 juillet	
Pouillot de Bonelli	X		15 avril au 15 juillet	Connu dans le Jura alsacien - à rechercher dans les Hautes-Vosges
Pouillot véloce			1 avril au 15 juillet	
Pouillot siffleur			15 avril au 15 juillet	
Pouillot fitis			<b>15 avril au 15 juillet</b>	<b>Attention aux migrateurs non nicheurs. Certains oiseaux chantent jusque mi-avril mais ne nichent pas : confirmer le stationnement</b>
Roitelet huppé			<b>15 avril au 15 juillet</b>	
Roitelet à triple bandeau			<b>15 avril au 15 juillet</b>	
Gobemouche gris			1 mai au 15 juillet	
Gobemouche à collier	X		1 mai au 15 juillet	A rechercher dans les zones favorables
Gobemouche noir			<b>1 mai au 15 juillet</b>	<b>Attention aux migrateurs réguliers en plaine dans les milieux semi-ouverts ne pas les noter.</b>
Mésange à longue queue			1 mars au 15 juillet	
Mésange nonnette			15 mars au 15 juillet	
Mésange boréale			15 mars au 15 juillet	
Mésange huppée			15 mars au 15 juillet	
Mésange noire			15 mars au 15 juillet	
Mésange bleue			15 mars au 15 juillet	
Mésange charbonnière			15 mars au 15 juillet	
Sittelle torchepot			15 mars au 15 juillet	
Grimpereau des bois			15 mars au 15 juillet	
Grimpereau des jardins			15 mars au 15 juillet	
Rémiz penduline	X	X	1 avril au 15 juillet	<b>A rechercher dans les zones favorables - attention aux migrateurs en avil</b>
Loriot d'Europe			1 mai au 15 juillet	
Pie-grièche écorcheur			10 mai au 15 juillet	
Pie-grièche grise	X	X	1 avril au 15 juillet	
Pie-grièche à tête rousse	X	X	10 mai au 15 juillet	A rechercher dans les zones favorables
Geai des chênes			15 mars au 15 juillet	
Pie bavarde			15 mars au 15 juillet	
Cassenois moucheté			15 mars au 15 juillet	A rechercher dans les Hautes-Vosges et les Vosges moyennes
Choucas des tours			<b>1 avril au 15 juillet</b>	

Espèces	LR	Espèces sensibles	Période de nidification (nicheurs possibles)	Remarques
Corbeau freux			1 avril au 1 juin	Seules les données de nidification certaine sont à mentionner
Corneille noire			15 mars au 15 juillet	
Grand Corbeau	X	X	1 mars au 15 juin	Nicheur précoce
Étourneau sansonnet			1 avril au 1 juin	
Moineau domestique			1 avril au 15 juin	
Moineau friquet			1 avril au 15 juin	
Pinson des arbres			15 mars au 15 juillet	
Serin cini			1 avril au 1 juillet	
Venturon montagnard			15 mars au 15 juillet	A rechercher dans les Hautes-Vosges et les Vosges moyennes
Verdier d'Europe			15 mars au 15 juillet	
Chardonneret élégant			1 avril au 15 juin	
Tarin des aulnes			<b>15 avril au 15 juillet</b>	<b>Attention aux migrants non nicheurs. Certains oiseaux chantent jusque mi-avril mais ne nichent pas : confirmer le stationnement</b>
Linotte mélodieuse			15 avril au 15 juillet	
Bec-croisé des sapins			15 février au 15 juin	Nicheur précoce
Roselin cramoisi			1 mai au 15 juillet	A rechercher dans les zones favorables
Bouvreuil pivoine			1 avril au 15 juillet	
Grosbec casse-noyaux			15 avril au 15 juillet	
Bruant jaune			15 mars au 15 juillet	
Bruant zizi	X		15 mars au 15 juillet	
Bruant fou			15 mars au 15 juillet	A rechercher dans les zones favorables
Bruant des roseaux			1 avril au 1 juillet	
Bruant proyer	X		1 avril au 1 juillet	